



Protocol H. Recollida de femta per investigar paràsits

- Tres dies abans de recollir la mostra no mengeu: maduixes, figues, peres, pomes, tomàquets, llegums secs o verds, pa amb llavors (segó, sèsam, etc.)
 - No s'han d'administrar medicaments a base de caolí, carbó vegetal, sals de magnesi, olis, laxants ni supositoris.
 - Destapeu el contenidor i amb la cullereta del tap introduïu en el líquid una porció de femta de la mida d'un pèsol, fins que el líquid arribi al nivell indicat en l'etiqueta del contenidor (ratlla negra). Si ha moc o sang agafeu d'aquestes parts.
 - Tapeu el contenidor, enroscat bé el tap. Agiteu-lo vigorosament. No cal guardar en nevera.
 - **Precaucions:** el líquid és tòxic. No es pot beure. No deixar-ho a l'abast dels nens. Si el toqueu, renteu-vos bé.
-

Protocolo H. Recogida de heces para el estudio de parásitos

- Tres días antes de recoger la muestra no coma: fresas, higos, peras, manzanas, tomates, legumbres secas o verdes, pan con semillas (salvado, sésamo, etc.).
- No tome medicamentos que contengan caolín, carbón vegetal, sales de magnesio, aceites, laxantes ni supositorios.
- Destapar el conenedor y con la cucharilla del tapón introducir en el líquido una porción de heces del tamaño de un guisante, hasta que el líquido llegue al nivel indicado en la etiqueta del conenedor (raya negra). Si hay moco o sangre coger de estas partes.
- Tapar el conenedor, enroscando bien el tapón. Agitar vigorosamente. No hace falta guardar en nevera.
- **Precauciones:** el líquido es tóxico. No se puede beber. No dejarlo al alcance de los niños. Si lo toca, lávese bien.



Protocol I. Instruccions per a la recollida de mostres de FEMTA per a l'estudi d'oxiürs.
Cinta de Graham

- Recolliu la mostra en llevar-vos i abans d'anar de ventre. Agafeu una cinta adhesiva transparent (tipus cel·lo)
 - Pressioneu la part adhesiva sobre tots els costats de l'anus (no a dins)
 - Enganxeu la cinta longitudinalment sobre el vidre que se us ha lliurat i poseu el vidre dins un sobre.
-

Protocolo I. Instrucciones para la recogida de muestras de HECES para el estudio de
Oxiuros. Cinta de Graham

- Recoga la muestra en el momento de levantarse y antes de ir de vientre. Coja una cinta adhesiva transparente (tipo cel·lo).
- Presione la parte adhesiva sobre los costados del ano (no dentro)
- Pegue la cinta longitudinalmente sobre el vidrio que se le ha dado y ponga el vidrio dentro de un sobre