



En què consisteix aquesta prova?

Aquesta prova consisteix en l'obtenció d'imatges radiogràfiques dels ronyons i les vies urinàries posteriorment a la injecció en vena d'un contrast iodat no iònic.

Quina preparació necessiteu?

1. Els tres dies anteriors a l'exploració

Heu de fer una dieta pobra en residus: no prengueu verdures, fruites, llegums, greixos ni productes integrals.

2. El dia abans de l'exploració (si aquesta és al matí) o el dia de l'exploració (si és a la tarda)

Si us heu de fer la prova en horari de **matí**: haureu de començar a prendre la solució evacuant a partir de les **17 h del dia anterior** (un sobre monodosi cada 15-30 minuts fins a prendre 8-12 sobres).

- Si us heu de fer la prova en horari de **tarda**: haureu de començar a prendre la solució evacuant a partir de les **8 h del dia que us feu la prova**.

Observacions:

Si tolereu malament la pauta d'administració, podeu allargar el temps entre les preses.

Recordeu, però, que heu de continuar prenent els sobres fins que les deposicions siguin clares.

3. El dia de l'exploració

Heu d'estar en dejú, sense fumar ni mastegar xiclets des de 8 hores abans de l'exploració.

Advertències importants

No és possible saber amb antelació qui pot presentar una reacció adversa al contrast, per això és important que si patiu algun tipus d'allèrgia, i molt especialment si és al iode, n'informeu al personal del Servei de Diagnòstic per la Imatge.

També heu d'avalar-lo en cas de patir insuficiència cardíaca, insuficiència renal, diabetis o asma.

La introducció del contrast iodat no iònic pot tenir uns riscos associats:

LLEUS	Nàusees, vòmits, eritema facial	No necessiten tractament. Desapareixen als pocs minuts.
MODERATS	Urticària, edema, pruïxa, broncospasme lleu, conjuntivitis, rinitis	Es corregeixen fàcilment amb medicació adequada.
GREUS	Hipotensió, dolor toràcic, urticària generalitzada, convulsions, aritmia, angioedema, insuficiència renal aguda i xoc	Es corregeixen amb tractament adequat.

Amb caràcter excepcional, podria produir-se la mort (0,27 casos per milió d'exploracions).

Normes generals:

Us demanem puntualitat.

Si per qualsevol motiu no podeu venir el dia de la cita, us demanem que ens ho comuniqueu tan aviat com us sigui possible. Truqueu, si us plau, al centre de salut o al Servei de Diagnòstic per la Imatge per tal que un altre pacient pugui ocupar el vostre lloc.

En dones en edat fèrtil, quan hi hagi la possibilitat d'embaràs, aquesta prova s'ha de fer en la primera fase del cicle menstrual. Per tant, hem de conèixer la data de l'última menstruació.

AQUESTA PROVA NECESSITA LA SIGNATURA D'UN CONSENTIMENT INFORMAT.

EL FET QUE NO RESPECTEU AQUESTES INSTRUCCIONS POT MOTIVAR EL RETARD O L'ANUL·LACIÓ DE L'EXPLORACIÓ.



¿En qué consiste esta prueba?

Esta prueba consiste en la obtención de imágenes radiográficas de los riñones y las vías urinarias, posteriormente a la inyección en vena de un contraste yodado no iónico.

¿Qué preparación necesita?

1. Los tres días anteriores a la exploración

Tiene que hacer una dieta pobre en residuos: no tome verduras, frutas, legumbres, grasas ni productos integrales.

2. El día antes de la exploración (si ésta es por la mañana) o el día de la exploración (si es por la tarde)

Si se tiene que hacer la prueba en horario de **mañana**: tendrá que empezar a tomar la solución evacuante a partir de las **17 h del día anterior** (un sobre monodosis cada 15-30 minutos) hasta haberse tomado entre 8-12 sobres.

Si se tiene que hacer la prueba en horario de **tarde**: tendrá que empezar a tomar la solución evacuante a partir de las 8 h anteriores a la hora en que se haga la prueba.

Observaciones

Si tolera mal la pauta de administración, puede alargar el tiempo entre tomas.

Pero recuerde que tiene que continuar tomando los sobres hasta que las heces sean claras.

3. El día de la exploración:

Debe estar en ayunas, sin fumar ni masticar chicles desde 8 horas antes de la exploración.

Advertencias importantes

No es posible saber con antelación qué paciente puede presentar una reacción adversa al contraste, por lo que si padece algún tipo de alergia, y muy especialmente alergia al yodo, informe de ello al personal del Servicio de Diagnóstico por la Imagen. También tendrá que avisar en caso de sufrir insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes o asma.

La introducción del contraste iodado no iónico puede tener unos riesgos asociados:

LEVES	Náuseas, vómitos, eritema facial	No necesitan tratamiento. Ceden a los pocos minutos.
MODERADO S	Urticaria, edema, prurito, broncoespasmo leve, conjuntivitis, rinitis	Se corrigen fácilmente con la medicación adecuada.
GRAVES	Hipotensión, dolor torácico, urticaria generalizada, convulsiones, arritmia, angioedema, insuficiencia renal aguda y shock	Se corrigen con tratamiento adecuado.

Con carácter excepcional podría producirse la muerte (0,27 casos por millón de exploraciones).

Normas generales: Le rogamos puntualidad.

Si por cualquier motivo no pudiera venir el día de la cita, le agradeceremos que nos lo comunique lo antes posible. Llame, por favor, a su centro de salud o al Servicio de Diagnóstico por la Imagen para que otro paciente pueda ocupar su lugar.

En mujeres en edad fértil, cuando exista posibilidad de embarazo, esta prueba se debe realizar en la primera fase del ciclo menstrual. Por lo tanto, debemos conocer la fecha de la última menstruación.

ESTA PRUEBA NECESITA LA FIRMA DE UN CONSENTIMIENTO INFORMADO.

EL HECHO DE NO RESPETAR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE MOTIVAR EL RETRASO O LA ANULACIÓN DE LA EXPLORACIÓN.